

НД РБ

10.09.2015  
ul. C. Swkowa 54, 05-800 Pruszków  
NIP: 534-248-49-43, Regon: 14598040  
tel.: 022 738 13 00, fax: 022 738 13 00  
(11)

**Инструкция по медицинскому применению  
(информация для пациента)**

Следует внимательно прочитать инструкцию, поскольку она содержит важную для пациента информацию.

**Торговое название**  
**ФИТОЛИЗИН®**  
(PHYTOLYSIN)

**Международное непатентованное название**  
Нет

**Форма выпуска**  
Паста для приема внутрь

**Состав**  
100 г пасты содержат  
*действующие вещества:* сгущенный экстракт (1:1,3-1,6; спирт 45°) смеси: золотарника обыкновенного травы, хвоща полевого травы, горца птичьего травы, пырея корневищ, лука репчатого шелухи, березы листьев, пажитника семян, петрушки корней, любистока корней - 67,2 г; шалфея мускатного масло 1,0 г, мяты перечной масло 0,5 г, сосны обыкновенной масло 0,2 г, апельсина сладкого масло 0,15 г  
*вспомогательные вещества:* глицерин 99,5%, агар, крахмал пшеничный, ванилин, этилпарагидроксibenзоат (E214), вода очищенная

**Описание**  
Мелкозернистая паста полутвердой консистенции, буро-зеленого цвета со специфическим ароматическим запахом.

**Название и адрес производителя**  
Гербаполь Варшава ООО  
ул. Олувкова 54, 05-800 Прускув, Польша  
Тел.: +48 22 7381300, факс: +48 22 7381303

**Фармакотерапевтическая группа**  
Прочие лекарственные средства, применяемые в урологии  
Код АТХ: G04BX

**Показания к применению**  
ФИТОЛИЗИН® применяется в комплексной терапии инфекционно - воспалительных заболеваний мочевыводящих путей и мочекаменной болезни.

**Способ применения и дозы**  
Взрослым назначают внутрь по 1 чайной ложке пасты, растворенной в 1/2 стакана теплой сладкой воды, 3-4 раза в день после еды. Длительность терапии определяется индивидуально в зависимости от достигнутого эффекта и переносимости препарата.

*Дети и подростки в возрасте до 18 лет*

Безопасность и эффективность препарата ФИТОЛИЗИН® у детей и подростков (до 18 лет) не были установлены. ФИТОЛИЗИН® противопоказан детям до 18 лет.

#### *Пациенты пожилого возраста*

У пациентов пожилого возраста не требуется корректировка дозы препарата.

#### *Пациенты с нарушением функции почек*

Корректировка дозы может быть необходима для пациентов с нарушением функции почек, в зависимости от степени нарушения функции почек.

Пожалуйста, свяжитесь с Вашим врачом, если Вы страдаете нарушением функции почек.

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

#### **Побочное действие**

Как и все лекарственные препараты, ФИТОЛИЗИН® может вызывать нежелательные побочные эффекты, хотя они появляются не у всех.

Возможны аллергические реакции, в отдельных случаях тошнота.

При повышенной чувствительности к ультрафиолетовым лучам возможны явления фотосенсибилизации.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

#### **Противопоказания**

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата (аллергические реакции на компоненты препарата)
- гломерулонефрит
- фосфатный уролитиаз
- возраст до 18 лет
- почечная недостаточность
- сердечная недостаточность
- отеки при заболеваниях сердца и/или почек
- обструкция мочевыводящих путей

#### **Передозировка**

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

#### **Меры предосторожности при применении**

Если во время приема лекарственного средства улучшения состояния не происходит или развиваются такие симптомы, как повышение температуры, боли и нарушения при мочеиспускании, появляется кровь в моче, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Не применять препарат в случае появления отеков, вызванных недостаточностью сердца или почек.

Во время применения препарата ФИТОЛИЗИН® рекомендуется применять большое количество жидкости.

#### **Применение во время беременности и в период кормления грудью**

В связи с отсутствием достаточных данных, прием препарата во время беременности и лактации не рекомендуется.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

**Влияние на способность управлять транспортными средствами или обслуживать механизмы**

До сих пор не отмечено отрицательного влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами и т.п.). Однако следует учитывать содержание этанола в препарате.

**Информация о вспомогательных веществах, которые важны для безопасного и эффективного использования препарата ФИТОЛИЗИН®**

ФИТОЛИЗИН® в составе вспомогательных веществ содержит глицерин, который может вызывать головную боль, желудочные расстройства и диарею.

ФИТОЛИЗИН® в составе вспомогательных веществ содержит пшеничный крахмал, который может содержать в незначительных количествах глютен.

Препарат не рекомендован для приема пациентам с аллергией на пшеницу, соблюдать осторожность пациентам с целиакией.

ФИТОЛИЗИН® в составе вспомогательных веществ содержит этилпарагидроксибензоат (E214), который может вызвать развитие аллергических реакций (в том числе замедленного типа).

ФИТОЛИЗИН® содержит этиловый спирт в количестве примерно 200 мг в одной дозе, что эквивалентно 5 мл пива или 2 мл вина. Содержание этилового спирта необходимо учитывать пациентам, страдающим алкоголизмом, беременным и кормящим женщинам, пациентам с заболеваниями печени и эпилепсией.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

В связи с мочегонным действием препарата следует учитывать возможность ускоренного выведения других, одновременно применяемых лекарственных средств.

ФИТОЛИЗИН® может усиливать действие:

- антиагрегантов (в том числе нестероидных противовоспалительных препаратов), антикоагулянтов
- гипогликемических лекарственных средств
- лекарственных средств, содержащих соли лития
- ингибиторов моноаминоксидазы
- пролонгировать действие пентобарбитала, аминопирина и парацетамола.

ФИТОЛИЗИН® может уменьшить всасывание в тонком кишечнике бета-каротина, альфа-токоферола, холестерина и других лекарственных средств.

**Условия хранения и срок годности**

Хранить в закрытых упаковках при температуре не выше 25 °С.


Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности: 3 года

Не применять препарат по истечении срока годности!

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта врача.

**Упаковка**

НД РБ

1040-2015  
Министерство здравоохранения Республики Беларусь  
Институт проблем безопасности радиационной медицины  
Учреждение образования «Институт проблем безопасности радиационной медицины»  
Тел.: 022 733 13 00, факс: 022 733 13 02  
(11)

По 100 г препарата помещают в тубы алюминиевые, покрытые внутри лаком. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь